

هشدار در مورد تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک سدیم و آمپول پیروکسیکام

علیرغم صدور اطلاعیه های پیاپی از جانب این مرکز در خصوص توجه به نکات لازم هنگام تجویز آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام متأسفانه همچنان مشاهده می شود که این آمپولها در مواردی غیر ضروری تجویز می گردد. با توجه به اینکه اخیراً دو مورد گزارش جدید افتادگی مچ پا متعاقب تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک سدیم به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش شده است از همکاران محترم درخواست می گردد هنگام تجویز این دارو به نکات زیر توجه فرمایند:

- ۱ - از تجویز آمپول دیکلوفناک سدیم در کودکان زیر ۱۵ سال جداً خودداری نمایید.
- ۲ - از تجویز آمپول دیکلوفناک سدیم در رفع علائم سرماخوردگی و یا درمان تب اجتناب نمایید.
- ۳ - در مواردی که تسکین درد با مصرف فرآورده های خوراکی ضد درد امکان پذیر است از تجویز آمپول دیکلوفناک سدیم بپرهیزید.
- ۴ - تزریق وریدی آمپول دیکلوفناک سدیم اکیداً ممنوع می باشد.
- ۵ - از آنجایی که آمپول پیروکسیکام نیز عوارض مشابه با آمپول دیکلوفناک سدیم ایجاد می نماید، رعایت کلیه موارد فوق هنگام تجویز پیروکسیکام نیز ضروری است. از همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه عارضه ناشی از مصرف آمپول دیکلوفناک سدیم و یا آمپول پیروکسیکام فرم مخصوص گزارش عوارض داروها (به پیوست می باشد) را تکمیل نموده به آدرس تهران، صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ ارسال نمایند و یا با شماره تلفن ۶۴۰۵۵۶۹ تماس حاصل فرمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه - معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی