

قطع تولید و توزیع داخلی آمپول های دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام به علت عارضه برگشت ناپذیر فلج پا

به دنبال دریافت گزارشهای متعدد عارضه برگشت ناپذیر فلج پا ناشی از تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام ساخت داخل و به منظور پیشگیری از وقوع مجدد این عارضه جدی که منجر به نقص عضو می گردد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به قطع تولید و توزیع این فرآورده ها نموده است.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ضمن قدردانی از جامعه پزشکی که با ارسال گزارش این عوارض، مرکز را در شناسایی آن یاری نموده اند، به اطلاع می رساند در راستای تامین ایمنی مصرف دارو (Drug Safety)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور قطع تولید و توزیع داخلی آمپولهای دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام را صادر نموده است. با توجه به کمبود موقت فرآورده ای ضد درد تزریقی توجه همکاران محترم را به این نکته معطوف می دارد که در درمان دردهای خفیف تا متوسط، در بسیاری موارد نیازی به استفاده از داروی ضد درد تزریقی نمی باشد. در این قبیل موارد می توان از داروهای ضد درد خوراکی یا شیاف استفاده نمود.

داروهای ضد درد خوراکی موجود در بازار ایران به شرح زیر می باشد:

قرص دیکلوفناک - کپسول پیروکسیکام - کپسول ایندومتاسین - قرص ACA - قرص استامینوفن - قرص آسپیرین - قرص ایبوپروفن - کپسول مفنامیک اسید - قرص ناپروکسن - قرص استامینوفن کدئین - قرص آسپیرین کدئین

شیافهای ضد درد موجود در بازار ایران شامل موارد زیر می باشد:

شیاف استامینوفن - شیاف دیکلوفناک - شیاف ایندومتاسین

همچنین داروهای ضد درد اپیوئیدی موجود در بازار ایران که معمولاً در کنترل دردهای شدید بیماران بستری و بیماران مبتلا به سرطان می توان از آنها استفاده نمود، شامل موارد زیر می باشد:

آلفنتانیل(تزریقی)- فنتانیل(تزریقی)- متادون(تزریقی و قرص)- مورفین(تزریقی)- پنتازوسین(تزریقی)- پتیدین(تزریقی)- سولفنتانیل(تزریقی)- تریاک(قرص)- کدئین فسفات(قرص)

بدیهی است هنگام تجویز هر یک از فرآورده های فوق حتماً نکات مربوط به موارد مصرف، موارد منع مصرف، تداخل های دارویی و سایر نکات معمول بایستی مورد توجه قرار گیرد.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه - معاونت غذا و دارو - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی