

نکات مهم در مورد تزریق آمپول Voltaren (دیکلوفناک سدیم)

به دلیل ایجاد عارضه افتادگی مچ پا توسط آمپول دیکلوفناک و پیروکسیکام ساخت داخل، تولید این داروها قطع گردید و از بازار دارویی کشور جمع آوری شد. در حال حاضر آمپول Voltaren (دیکلوفناک سدیم) ساخت شرکت سازنده اصلی اروپایی وارد بازار دارویی گردیده است که در این ارتباط توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نمائیم:

- ۱ - تزریق آمپول دیکلوفناک سدیم در کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع می باشد.
 - ۲ - جهت پیشگیری از آسیب عصب یا بافت محل تزریق عضلانی، این آمپول باید به صورت عمیق در ربع فوقانی خارجی عضله گلوئئال تزریق گردد. همچنین در موارد دردهای شدید که تزریق عضلانی دو آمپول در فاصله چند ساعت لازم است، در هریک از عضلات گلوئئال راست و چپ فقط یک آمپول تزریق گردد.
 - ۳ - آمپول Voltaren نباید بیش از دو روز مصرف گردد. در صورت نیاز به مصرف این دارو بیش از دو روز، می توان از قرص یا شیاف این دارو استفاده نمود.
 - ۴ - تزریق وریدی این دارو فقط جهت درمان ویا پیشگیری ری از درد بعد از عمل جراحی در بیمارستان یا شرایط بسیار حساس طبق رفرانسهای معتبر مجاز است.
 - ۵ - جهت اطلاعات بیشتر در رابطه با موارد مصرف، موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و عوارض ناخواسته به بروشور این فرآورده مراجعه فرمایید.
- از کلیه همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه عارضه ناشی از مصرف فرآورده فوق، فرم مخصوص گزارش عوارض دارویی را تکمیل نموده به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ارسال دارند و یا با شماره تلفن ۶۴۰۵۵۶۹ تماس حاصل نمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه - معاونت غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی