

کوتریموکسازول و عوارض ناشی از آن

- در مصرف داروی کوتریموکسازول احتیاطات ذیل را باید در نظر گرفت:
- ۱ - با توجه به میزان بالای بروز حساسیت نسبت به کوتریموکسازول، لزوم پی گیری افراد تحت درمان با کوتریموکسازول مشخص می گردد و باید این آگاهی به بیمار داده شود که در صورت بروز هرگونه عارضه، مراتب را به پزشک معالج گزارش کند. در برخورد با بروز خفیف عارضه، احتمال بهبودی و رفع حساسیت وجود دارد و بیمار قادر به تحمل ادامه درمان است ولی در صورت پیشرفت عوارض راش، تب، درد مفاصل، سرفه، پورپورا و کوتاهی تنفس دارو در مانی باید قطع گردد.
 - ۲ - مصرف کوتریموکسازول در کودکان با احتیاط صورت می گیرد. در ۴-۱ درصد کودکان دریافت کننده کوتریموکسازول، اریتم سمی خفیف و درماتیت اکسفولیاتیو و سندرم استیونس - جانسون بروز می کند. کوتریموکسازول در کودکان کمتر از ۲ ماه نباید مصرف شود. ایمنی و اثر بخشی استفاده مکرر کوتریموکسازول در کودکان کمتر از ۲ سال به جز عفونت *Pneumocystis carinii* بطور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
 - ۳ - احتیاط در مصرف کوتریموکسازول در افراد پیر به خصوص کسانی که دارای نارسایی های کبد و کلیوی هستند، لازم به نظر می رسد. واکنشهای شدید پوستی کوتریموکسازول در بیماران پیر ممکن است منجر به مرگ گردد.
 - ۴ - از مصرف این دارو در بیماران با سابقه حساسیت به کوتریموکسازول یا اجزاء آن باید خودداری نمود.
 - ۵ - از مصرف این دارو در بیماران با نارسایی شدید کبدی باید خودداری کرد و در ضایعات خفیف تر کبدی، این دارو باید با احتیاط مصرف شود.
 - ۶ - در بیماران با ضایعه کلیوی، دارو را باید با احتیاط مصرف نمود.
 - ۷ - برای کاهش خطر کریستالوریا، بیمار با عی مایعات زیاد مصرف کند.
 - ۸ - از مصرف کوتریموکسازول در بیماران با کمبود آنزیم گلوکز ۶- فسفات دهیدروژناز باید خودداری شود.

با توجه به گزارشات ارسالی در ارتباط با عوارض کوتریموکسازول به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها، از کلیه همکاران خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه عارضه، فرم مخصوص ثبت و بررسی عوارض داروها را تکمیل نموده و به آدرس تهران- صندوق پستی ۹۴۸-۱۴۱۸۵ ارسال نمایید. جهت اطلاع بیشتر می توانید با شماره تلفن ۶۴۰۵۶۹ تماس حاصل فرمایید.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها

دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذایی و دارویی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی