

هشدار در رابطه با ایجاد مسمومیت کشنده با متادون بخصوص در اطفال

متادون که بعنوان داروی ترک اعتیاد مصرف می شود در صورت مصرف اشتباهی می تواند ایجاد مسمومیت شدید و حتی کشنده بخصوص در اطفال نماید. از علائم مسمومیت با متادون می توان به: کاهش سطح هوشیاری، اختلالات تنفسی، تهوع، استفراغ، نبض ضعیف و افت فشار خون، سفتی و تکانه های عضلانی اشاره کرد. بر طبق اطلاعیه شماره ۷۴ مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی در یکی از موارد مسمومیت با متادون یکی از بستگان کودک که شربت متادون مصرف می کرد ان را در داخل شیشه نوشابه ریخته بود که کودک با مصرف اشتباه ان بعد از مدت کوتاهی دچار تهوع و استفراغ، درد قفسه سینه و سایر علائم مسمومیت شده و بعد از گذشت چند ساعت با پیشرفت علائم متأسفانه کودک فوت می کند

بر اساس امار مرکز DPIC این معاونت از سال ۸۸ تا ۹۳ جمعاً ۴۸۳ نفر بر اثر مسمومیت با متادون در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) بستری شدند که از این تعداد ۲۰۶ نفر کودک بودند و ۸ نفر جان خود را از دست دادند. لذا لازم است جهت پیشگیری از بروز مسمومیت با متادون بخصوص در اطفال موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

* این دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود

* از نگهداری شربت متادون در یخچال و یا کنار سایر نوشیدنی ها خوددای شود

* با توجه به طعم شیرین شربت متادون از ریختن شربت متادون در بطری اب، نوشابه یا شیشه سایر شربت ها مثل دیفن هیدرامین یا استامینوفن (که احتمال مصرف اتفاقی یا اشتباهی ان توسط والدین به کودکان وجود دارد) خودداری شود

در صورت وقوع مسمومیت حتما به اورژانس مراجعه نمایید

مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم

معاونت غذا و دارو رفسنجان

دکتر دادگرنیا