

* هشدار *

سيزاپرايد Cisapride

سيزاپرايد جهت پيشگيري و درمان علامتي رفلاكس معدي - مري (Gastroesophageal) در مواردی كه بیمار به سایر درمانها پاسخ دهی مناسب نداشته باشد، تجویز می گردد.

* با توجه به عوارض شديد و گزارشات مرگ ناشی از مصرف این دارو از همكاران محترم تقاضا می شود هنگام تجویز سيزاپرايد به موارد ذیل توجه فرمایند:

- ۱ - این دارو در بیماران مبتلا به هر گونه اختلالات قلبی خصوصاً كاردیومیوپاتی، برادی كاردی، نارسائی احتقانی قلب (CHF)، بلوك درجه ۲ و ۳ دهلیزی - بطنی و اختلالات عملكرد گره سینوسی منع مصرف دارد.
 - ۲ - در افرادیكه سابقه بیماریهایی نظیر طولانی شدن فاصله QT، آریتمی بطنی، ایسكمی، بیماریهای دریچه ای قلب و یا سابقه مشخص شده فامیلی سندرم Long QT مادرزادی دارند، منع مصرف دارد.
 - ۳ - استفاده همزمان این دارو با داروهای مهار كننده آنزیم سیتوكروم P450 3A4 مانند آنتی بیوتیکهای ماکرولیدی (اریترومایسین،...)، ضد قارچها (كتوکونازول، ایتراكونازول، فلوكونازول، میکونازول،...)، مهار كننده های HIV پروتئاز (ایندیناویر، نلفیناویر، ریتوناویر، ...) و داروهایی كه منجر به طولانی شدن فاصله QT می شوند مانند آنتی آریتمی ها (كینیدین، سوتالول، پروكائین آمید، ...)، ضد افسردگی های سه حلقوی، برخی ضد افسردگی های چهار حلقوی، برخی آنتی سایكوتیکها (فنوتیازین ها، ...)، استامیزول، پپريدیل و ترفنادین منع مصرف دارد.
 - ۴ - این دارو در نارسایی های کلیوی و تنفسی و سرطانهای پیشرفته منع مصرف دارد.
 - ۵ - در صورتیکه افزایش حرکات دستگاه گوارش خطرناک باشد مانند بیماران مبتلا به خونریزیهای گوارشی و انسداد مکانیکی روده و پرفوراسیون، از مصرف این دارو خودداری گردد.
 - ۶ - در شرایطی كه منجر به اختلالات الكترولیتی می گردد، مانند دهیدراسیون شديد، استفراغ و سوء تغذیه از مصرف این دارو خودداری گردد.
 - ۷ - از مصرف همزمان این دارو با دیورتیکهای دفع كننده پتاسیم و انسولین (در بیماران مصرف كننده در فاز Acute Settings) و آب گریپ فروت خودداری شود.
 - ۸ - با توجه به گزارشات متعدد مرگ ناشی از مصرف این دارو در کودکان، ایمنی و كارآیی این دارو در کودکان زیر ۱۶ سال به اثبات نرسیده است.
- توصیه می گردد قبل از تجویز سيزاپرايد، الكتروكارديوگرام و تستهای خونی نظیر اندازه گیری كراتینین و الكترولیتهاى سرم (كلسیم، منیزیم، پتاسیم و...) انجام گیرد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو